

**SANGUE OCCULTO**

Contenitore dedicato o in alternativa raccolta su normale contenitore per feci:

- raccogliere (in tre differenti zone delle feci) uno o più campioni (secondo richiesta medica), in giorni successivi
- conservare in luogo fresco
- inviare in laboratorio

PARASSITI INTESTINALI

Nei giorni precedenti la raccolta non assumere antibiotici,antidiarroici, lassativi. Si consiglia di raccogliere 3 campioni di feci (o secondo richiesta medica) in giorni successivi, negli appositi contenitori. Inviare ciascun campione in laboratorio entro 2-4 ore dalla raccolta (nell' impossibilità conservare in frigorifero per non più di 24 ore). Compilare al momento della consegna la scheda informativa consegnata in segreteria

SCOTCH TEST

Si consiglia di eseguire 3 scotch (o secondo richiesta medica), in giorni successivi : al mattino, prima di lavarsi e di defecare, staccare lo scotch dal vetrino (reperibile in laboratorio) e farlo aderire alla mucosa anale. Disporlo sul vetrino dallo stesso lato. Ripetere l' operazione i giorni successivi.

Dopo la raccolta conservare il 1° e il 2° scotch in frigorifero; raccolto il 3° scotch, inviare in laboratorio i tre campioni entro 2-4 ore.

PROTOZOI INTESTINALI (Giardia)

Nei giorni precedenti la raccolta non assumere antibiotici, antidiarroici,lassativi

Raccogliere 3 campioni di feci, in giorni successivi, negli appositi contenitori e inviare ciascun campione in laboratorio entro 30-60 minuti dalla raccolta.

COPROCOLTURA (per ricerca batteri e virus)

Raccogliere un campione di feci nell' apposito contenitore e inviare immediatamente in laboratorio (nell' impossibilità conservare in frigorifero per non più di 12ore)